

INFORMACINIS LAPELIS
HEPAGEN, injekcinis tirpalas

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas:

Fatro S.p.A.,
Via Emilia 285,
40064 Ozzano dell'Emilia,
Bologna,
Italija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

HEPAGEN, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

fenoksi-2-metil-2-propiono rūgšties (natrio druskos) 100 mg;

pagalbinės medžiagos:

injekcinio vandens iki 1 ml.

4. INDIKACIJOS

Galvijams, arkliams, ožkoms, kiaulėms ir šunims, sutrikus virškinimui, esant alimentinei toksikozei, sutrikus kepenų funkcijoms, sumažėjus apetitui, esant timpanijai, kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus, sergančius virškinimo trakto parazitinėmis ligomis:

galvijams, ožkoms, esant alimentinei toksikozei, sutrikus didžiojo prieskrandžio veiklai, esant dispepsijai ir meteorizmui, ketozei (acetonemijai), kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus sergančius distomatoze ir dikrocelioze,

arkliams, sutrikus kepenų funkcijoms dėl nesubalansuoto šėrimo ar sergant piroplazmoze ir leptospiroze, **kiaulėms**, esant enterotoksemijai, sutrikus kepenų funkcijoms, esant edemai, sutrikus apetitui, užkietėjus viduriams pvz., apsiparšėlius ar nujunkius paršėlius,

šunims, esant geltai, sutrikus kepenų funkcijoms, kaip pagalbinė priemonė gydant gyvūnus, sergančius leptospiroze ir maru.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, arkliai, ožkos, kiaulės, šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti sušildytą iki kūno temperatūros į raumenis, pilvo ertmę ar lėtai į veną. Vidutinė rekomenduotina dozė yra 10 mg/kg kūno svorio.

Galvijui, suaugusiam arkliui, sveriančiam iki 300 kg reikia švirkšti 30 ml,
sveriančiam 500 kg – 40 ml,
sveriančiam daugiau kaip 500 kg – 50 ml,

veršeliui, kumeliukui, ožkai, kiaulei – 5-15 ml,
paršeliui, šuniui – 1 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.

Nurodytomis dozėmis galima švirkšti pakartotinai kas 24 val., jei skyrė veterinarijos gydytojas.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.
Negalima maišyti su kalcio druskomis.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiai nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo šviesos.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2009-04-21

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo kepenų ligų.

ATCvet kodas: QA05BA.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo vietiniu atstovu.