

**INFORMACINIS LAPELIS**  
METABOLASE, injekcinis tirpalas

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A.,  
Via Emilia, 285,  
I-40064 Ozzano dell'Emilia, Bologna,  
Italija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

METABOLASE, injekcinis tirpalas

**3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 ml tirpalo yra:

**veikliųjų medžiagų:**

l-karnitino hidroklorido, atitinkančio 5 mg l-karnitino	6,133 mg,
tiokto rūgšties	0,2 mg,
piridoksino hidroklorido	0,15 mg,
ciankobalamino	0,03 mg,
d.l-acetilmetionino	20 mg,
l-arginino	2,4 mg,
l-ornitino hidroklorido, atitinkančio 1,2 mg l-ornitino	1,532 mg,
l-citrulino	1,2 mg,
l-lizino hidroklorido, atitinkančio 0,5 mg l-lizino	0,625 mg,
glicino	1,5 mg,
asparto rūgšties	1,5 mg,
glutamo rūgšties	1,5 mg,
fruktozės	50 mg,
sorbitolio	80 mg;

**pagalbinių medžiagų:**

natrio propil-p-hidroksibenzoato	0,15 mg,
natrio metil-p-hidroksibenzoato	1,5 mg,
etanolio, injekcinio vandens	iki 1 ml.

**4. INDIKACIJOS**

Galvijų, buivolų, arklių, kiaulių, avių, ožkų, triušių, šunų ir kačių organizmui stiprinti ir detoksikuoti, patyrus fizinį stresą ar sveikstant.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, buivolai, arkliai, kiaulės, avys, ožkos, triušiai, šunys ir katės.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Pašildytas iki kūno temperatūros tirpalas, laikantis aseptikos reikalavimų gali būti švirkščiamas į veną, po oda ar į pilvo ertmę.

Suaugusiam **galvijui**, **arkliui** ar **kiaulei** į veną, po oda ar į pilvo ertmę galima sušvirkšti 250–500 ml preparato 2 kartus per parą, **veršeliui**, **kumeliukui**, suaugusiai **ožkai** ar **aviai** į veną, po oda ar į pilvo ertmę – 250 ml 2 kartus per parą, **paršeliui** ar **penimai kiaulei** po oda – 20–40 ml 10 kg kūno svorio 2 kartus per parą, **ėriukui**, **ožkiukui** į veną, po oda ar į pilvo ertmę – 20–40 ml 10 kg kūno svorio 2 kartus per parą, **triušiai** ir **katei** po oda įvairiose vietose – 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus per parą, **šuniui** į veną ar po oda – 2–4 ml 1 kg kūno svorio 2 kartus per parą.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Naudojant preparatą, būtina taikyti įprastas aseptikos procedūras.  
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

## 10. IŠLAUKA

0 parų.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.  
Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Laikyti sausoje vietoje.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

## 13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## 14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-06-27

## 15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.  
Farmakoterapinė grupė: vitaminai, amino rūgštys, detoksikuojančios medžiagos.  
ATCvet kodas: QA11BA.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.