

**INFORMACINIS LAPELIS**  
FATROXIMIN, putojančios gimdos ovulės

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas:

FATRO S.p.A.  
Via Emilia, 285  
Ozzano dell'Emilia (Bologna)  
Italija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

FATROXIMIN, putojančios gimdos ovulės

**3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS**

4 g ovulėje yra:

**veikliosios medžiagos:**

rifaksimino

300 mg;

**pagalbinių medžiagų**

iki 4 g.

**4. INDIKACIJOS**

Karvėms, buivolėms, kumelėms, paršavedėms, avims, ožkoms, sergančioms ūmiu ir lėtiniu endometritu, metritu, cervicitu, vulvovaginitu, kurių sukėlėjai jautrūs rifaksiminiui, gydyti ir profilaktiškai, užsilaikius nuovaloms, po manualinės ar instrumentinės akušerinės pagalbos.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos. Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

**7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Karvės, buivolės, kumelės, paršavedės, avys, ožkos.

**8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Prieš naudojimą rekomenduotina nustatyti mikroorganizmų jautrumą preparato veikliosioms medžiagoms.

Dezinfekavus išorinius lyties organus, ovules reikia dėti į gimdą. Karvei, buivolei ir kumelei, sergančiai metritu, endometritu ir cervicitu, reikia dėti 4 ovules vieną kartą arba du kartus po 2 ovules

kas 24 val., sergančioms vulvovaginitu – du kartus po 1 ovulę kas 24 val., užsilaikius nuovaloms – 4 ovules vieną kartą, teikus akušerinę pagalbą – 2 ovules vieną kartą profilaktiškai.  
Paršavedei, aviai, ožkai sergančiai metritu, endometritu, cervicitu ar vulvovaginitu, reikia dėti 2 ovules vieną kartą arba du kartus po 1 ovulę kas 24 val., užsilaikius nuovaloms – 2 ovules vieną kartą, teikus akušerinę pagalbą, profilaktiškai – 1 ovulę. Jeigu praėjus 12–24 val. po gydymo nuovalos nepasišalina, į gimdą reikia dėti kitas 2 ovules.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Vaistas skirtas patelėms po atsivedimo. Galima naudoti patelėms laktacijos metu.

## **10. IŠLAUKA**

0 parų.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Tamsioje, sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Nėra.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2006-06-27

## **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: gimdos antibakterinės medžiagos. ATCvet kodas: QG51AA06.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.