

**INFORMACINIS LAPELIS**  
AINIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Industrial Veterinaria, S.A.-Invesa  
Esmeralda, 19  
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
Ispanija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

AINIL 100 mg/ml, injekcinis tirpalas

**3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 ml tirpalo yra:

**veikliosios medžiagos:**

ketoprofeno 100 mg;

**pagalbinių medžiagų:**

benzilo alkoholio ir kt. iki 1 ml.

**4. INDIKACIJOS**

**Galvijams** gydyti, sergant kvėpavimo takų uždegimu, tešmens edema, ūmiu mastitu, skeleto ir raumenų uždegimu, taip pat skausmui, karščiavimui ir uždegimui malšinti.

**Arkliams**, sergantiems kaulų ir sąnarių, skeleto ir raumenų skausmingu uždegimu (trauminiu laminitu, artritu, artroze, esant sąnarių traumoms (sinovitiui, pasitempus sausgysles), lūžiams, tendinitui, kojų pažeidimams (podotrochlitui, kanopų traumoms, ribotam pododermatitui, šlubuojant), uždegimui po operacijų, gydyti ir skausmui malšinti, taip pat simptominiam gydymui, sergant diegliais.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Kaip ir kitų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) naudojimo atvejais, vaisto negalima naudoti gyvūnams, kuriems yra stiprus inkstų nepakankamumas.

Negalima naudoti gyvūnams, kuriems anksčiau nustatytas jautrumas ketoprofeniui.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nustatyta, kad naudojus vaistą gydymosiomis dozėmis, ketoprofenas yra saugus ir nepalankių reakcijų nesukelia.

Švirkštus į raumenis, gali susidaryti vietinis skausmingas iki 10 cm skersmens tynis, praeinantis per savaitę, baigus gydymą.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinės gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai ir arkliai.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

**Galvijams** į veną arba į raumenis reikia švirkšti po 3 ml tirpalo 100 kg kūno svorio (atitinka 3 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio) vieną kartą per dieną, 1–3 d. iš eilės.

**Arkliams** vaistą reikia švirkšti į veną. Gydant sergančius skeleto ir raumenų ar kaulų ir sąnarių ligomis arklius, švirkščiami po 1 ml tirpalo 45 kg kūno svorio (atitinka 2,2 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio) vieną kartą per dieną, 3–5 dienas iš eilės.

Dieglių simptomams mažinti švirkščiami po 1 ml tirpalo 45 kg kūno svorio (atitinka 2,2 mg ketoprofeno 1 kg kūno svorio) vieną kartą. Vienkartinio gydymo paprastai užtenka. Norint švirkšti pakartotinai, būtina įvertinti klinikinę arklio būklę.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Ketoprofeno poveikis vaisingumui, vaikingumui ar vaisiaus žūčiai nenustatytas, todėl negalima naudoti kumelėms kumelėms ir jaunesniems kaip 15 d. amžiaus kumeliukams.

Negalima vienu metu naudoti kitas nesteroidines medžiagas nuo uždegimo, diuretikus ir antikoagulantus.

Perdozavus gali pasireikšti anoreksija (apetito nebuvimas), vėmimas ar viduriavimas.

Negalima maišyti su rūgštinėmis medžiagomis.

## 10. IŠLAUKA

Galvijienai ir subproduktams – 4 paros, pienui – 0 parų.

Neregistruota naudoti arkliams, kurių mėsa skirta žmonių maistui.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Buteliuką laikyti kartoninėje dėžutėje.

Negalima naudoti, pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės ar dėžutės.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 7 dienos.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Negalima maišyti viename švirkšte su kitais vaistais.

Ypatingų atsargumo priemonių, siekiant išvengti atsitiktinio iššvirkštimo, reikia imtis žmonėms, kuriems nustatyta astma, angioedema, dilgėlinė arba rinitas, susijęs su nesteroidinių vaistų nuo uždegimo naudojimu,

Žmonės, turintys dvylikapirštės žarnos opų, kraujuojantys, sergantys inkstų, širdies, kepenų nepakankamumu ar hipertenzija, atsitiktinai iššvirkštę vaisto, turi nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Būtina vengti vaisto patekimo į akis, ant gleivinių, žaizdų ar sudirgusios odos. Patekus vaisto, tą vietą reikia gausiai plauti vandeniu.

### **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2009-04-29

### **15. KITA INFORMACIJA**

Farmakoterapinė grupė: nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo.

ATCvet kodas: QM01AE03.

Ketoprofenas yra propiono rūgšties darinys, priklausantis nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo grupei.

Patekęs į organizmą ketoprofenas greitai absorbuojamas. Sušvirkštus į raumenis, galvijams ketoprofeno didžiausia koncentracija kraujo plazmoje ( $8,025 \pm 1,9 \mu\text{g/ml}$ ) susidaro per trumpiau nei 1 val., o biologinis prieinamumas yra beveik 100 %. Daugiau kaip 98 % ketoprofeno jungiasi su kraujo plazmos baltymais ir kaupiasi uždegimo pažeistuose audiniuose, gerai jungiasi su sinovijos audiniais. Ketoprofenas greitai pasiskirsto ir greitai pašalinama.

Pakuočių dydžiai: buteliukai po 10, 20, 50 ir 100 ml.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.