

INFORMACINIS LAPELIS
FERTAGYL, injekcinis tirpalas

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Tiekimo rinkai teisės turėtojas:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5830 AA Boxmeer
Olandija

Vaisto serijos gamintojai:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Boxmeer
Olandija

Intervet International GmbH,
Feldstrasse 1a, D-85701 Unterschleissheim,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERTAGYL, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml yra:

veikliosios medžiagos:

gonadorelino

0,1 mg,

pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido, benzilo alkoholio, injekcinio vandens.

4. INDIKACIJOS

Karvėms gydyti, esant kiaušidžių folikulinėms ir liuteininėms cistoms bei apvaisinimui gerinti, triušėms ovuliacijai sukelti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos. Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Galvijai, triušiai.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vaistą reikia švirkšti į raumenis.

Gyvūnų rūšis	Indikacijos	Dozės
Karvės	Esant kiaušidžių cistoms	0,5 mg
	Vaisingumui gerinti dirbtinio sėklinimo metu	0,25–0,5 mg
	Vaisingumui gerinti lytinio ciklo viduryje (11–14 d.)	0,25–0,5 mg
	Lytiniam ciklui stimuliuoti po aspsiveršiavimo (iki 40 d.)	0,1–0,25 mg
Triušės	Ovuliacijai sukelti	0,02 mg

Praėjus 18-23 d. po preparato sušvirkštimo karvės suruoja ir gali būti apsėklintos. Paprastai sėkmingai apvaisina po pirmojo sėklinimo.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Negalima naudoti vaikingoms patelėms.

10. IŠLAUKA

Galvijienai, pienui ir triušienai – 0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti 2–8 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Tinkamumo laikas pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę – 24 val.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-11-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: gonadotropiną atpalaiduojantys hormonai. ATCvet kodas: QH01CA01. Gonadorelinas – sintetinis dekaeptidas, identiškas natūraliam gonadotropiną atpalaiduojančiam hormonui (GnRH), kuris gaminamas pagumburyje. Jo veikiama hipofizė išskiria liuteinizuojantį (LH) ir folikulus stimuliuojantį (FSH) hormonus. FSH stimuliuoja folikulų vystymąsi, o LH sukelia ovuliaciją ir geltonojo kūno susidarymą kiaušidėse. Gonadorelino poveikis FSH ir LH išskyrimui priklauso nuo lytinio ciklo fazės.

Panaudotas lytinio ciklo viduryje (11–14 d.) gonadorelinas skatina geltonkūnio funkciją ir folikulinių cistų subrendimą. Sušvirkštas 15–40 d. po apsisiveršavimo (ypač didelio produktyvumo gyvuliams) stimuliuoja lytinį ciklą, mažina galimybę sirgti kiaušidžių ligomis, trumpina periodą tarp veršiamosios ir rujos.

Sušvirkšto rekomenduotomis dozėmis gonadorelino didžiausia koncentracija serume susidaro po maždaug 17 min. Didžiausi FSH ir LH kiekiai susidaro praėjus 2–2,5 val. po vaisto sušvirkštimo. Gonadorelino eliminacijos pusperiodis – 21 min.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.