

## VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

### 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

CESTAL CAT FLAVOUR, tabletės

### 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra:

**veikliųjų medžiagų:**

pirantelio embonato	230 mg,
prazikvantelio	20 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

### 3. VAISTO FORMA

Tabletės.

### 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

#### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

#### 4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms ir kačiukams profilaktiškai ir dehelmintizuoti užsikrėtus:

askaridėmis	<i>Toxocara cati</i> , <i>Toxascaris leonina</i> (subrendusiomis ir nesubrendusiomis),
ankilostomomis	<i>Ancylostoma tubaeforme</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> (subrendusiomis),
cestodais	<i>Taenia taeniaeformis</i> , <i>Taenia pisiformis</i> , <i>Taenia hydatigena</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> (subrendusiais ir nesubrendusiais).

#### 4.3. Kontraindikacijos

Reikia apdairiai naudoti išsekusioms katėms. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

#### 4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

#### 4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

##### Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

##### Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojus vaistą reikia plauti rankas.

#### **4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)**

Preparatas yra mažai toksiškas ir pasižymi plačiomis saugumo ribomis. Saugumo tyrimų su paskirties gyvūnais duomenimis, preparatą naudojusiems net 3 kartus didesnėmis dozėmis jokių klinikinių, hematologinių ar biocheminių nepalankių reakcijų nustatyta nebuvo.

#### **4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu**

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

#### **4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos**

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais, nes pasireiškia abipusis antagonizmas su piranteliu. Prieš gydymą alkinti ar laikytis specialaus šėrimo režimo nebūtina.

#### **4.9. Dozės ir naudojimo būdas**

Vaistą reikia sušerti. Vieną tabletę reikia skirti 4 kg kūno svorio (atitinka 5 mg prazikvantelio ir 57,5 mg pirantelio embonato 1 kg kūno svorio). Tabletę rekomenduotina duoti tiesiai į burną arba sutrynus įmaišyti į ėdesį. Gydyti rekomenduotina prieš šėrimą.

Dažniausiai pakanka preparatą skirti vieną kartą, tačiau didelės parazitų invazijos atveju rekomenduotina dehelmintizuoti pakartotinai po 14 d. Profilaktiškai kates reikėtų dehelmintizuoti kas 3 mėn.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)**

Katės preparatą labai gerai toleruoja, todėl perdozavimo atvejai būna labai retai. Naudojus 3 kartus didesnę nei rekomenduotina dozę, nepastebėta jokių apsinuodijimo požymių. Jei įtariama, kad preparato buvo perdozuota, reikia imtis atitinkamų gydymo priemonių.

#### **4.11. Išlauka**

Nenumatyta.

### **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: antihelminčių medžiagų deriniai.  
ATCvet kodas: QP52AA51.

Tai plataus veikimo spektro antihelminčinis preparatas, sudarytas iš prazinkvantelio ir pirantelio embonato. Preparatas efektyviai veikia dažniausiai sutinkamus kačių cestodus ir nematodus bei kai kurias jų nesubrendusias formas. Prazikvantelis yra viena efektyviausių cestocidinių medžiagų, kuri naikina dažniausiai parazituojančius cestodus (*Taenia taeniaformis*, *T. pisiformis*, *T. hydatigena*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*). Pirantelio embonatas, naudojant 57,5 mg/kg kūno svorio vienkartinę dozę, efektyviai veikia virškinimo trakte parazituojančius nematodus (*Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*) bei ankilostomas (*Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*).

### **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

#### **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Laktozės monohidratas, kviečių krakmolai, povidonas, talkas, magnio stearatas, karboksimetilkrakmolo natrio druska, džiovintos mielės, kepenų kvapo medžiagos.

## **6.2. Nesuderinamumai**

Nežinomi.

## **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės – 2 metai.

## **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Negalima užšaldyti.

## **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Polietileno/aliuminio folijos dvisluoksnės juostelės po 2 tabletes, kartoninėse dėžutėse po 10 ar 50 tablečių.

## **6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **7. REGISTRUOTOJAS**

Ceva Santé Animale,  
Z.I. La Ballastiere,  
33500 Libourne,  
Prancūzija.

## **8. REGISTRACIJOS NUMERIAI**

LT/2/03/1552/001-002

## **9. PERREGISTRACIJOS DATA**

2008-04-24

## **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

2008-06-13

## **DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Nėra.

## ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

### **1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

CESTAL CAT FLAVOUR, tabletės

### **2. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS**

Vienoje tabletėje yra:  
pirantelio embonato 230 mg,  
prazikvantelio 20 mg.

### **3. VAISTO FORMA**

Tabletės.

### **4. PAKUOTĖS DYDIS**

10 tablečių  
50 tablečių

### **5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Katės.

### **6. INDIKACIJOS**

Katėms dehelmintizuoti.

### **7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS**

Tabletę reikia sušerti.

### **8. IŠLAUKA**

### **9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Negalima užšaldyti.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI  
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama be recepto.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Ceva Santé Animale,  
Z.I. La Ballastiere,  
33500 Libourne,  
Prancūzija.

**16. REGISTRACIJOS NUMERIS**

LT/2/03/1552/001  
LT/2/03/1552/002

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Ser. Nr. {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT BLISTERIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ  
DVISLUOKSNĖ JUOSTELĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

CESTAL CAT FLAVOUR, tabletės

**2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS**

Ceva Santé Animale, Prancūzija.

**3. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**4. SERIJOS NUMERIS**

Ser. Nr. {numeris}

**5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariniam naudojimui.

**INFORMACINIS LAPELIS**  
CESTAL CAT FLAVOUR, tabletės

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas:

Ceva Santé Animale,  
Z.I. La Ballastiere,  
33500 Libourne,  
Prancūzija

Vaisto serijos gamintojas:

Lavet Pharmaceutical Ltd.  
2143 Kistarcsa, Batthyany u. 4/b,  
Vengrija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

CESTAL CAT FLAVOUR, tabletės

**3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS**

Vienoje tabletėje yra:

**veikliųjų medžiagų:**

pirantelio embonato	230 mg,
prazikvantelio	20 mg.

**4. INDIKACIJOS**

Katėms ir kačiukams profilaktiškai ir dehelmintizuoti užsikrėtus:

askaridėmis	<i>Toxocara cati, Toxascaris leonina</i> (subrendusiomis ir nesubrendusiomis),
ankilostomomis	<i>Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala</i> (subrendusiomis),
cestodais	<i>Taenia taeniaeformis, Taenia pisiformis, Taenia hydatigena, Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis</i> (subrendusiais ir nesubrendusiais).

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Reikia apdairiai naudoti išsekusioms katėms. Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Preparatas yra mažai toksiškas ir pasižymi plačiomis saugumo ribomis. Saugumo tyrimų su paskirties gyvūnais duomenimis, preparatą naudojant net 3 kartus didesnėmis dozėmis jokių klinikinių, hematologinių ar biocheminių nepalankių reakcijų nustatyta nebuvo.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Katės.

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Vaistą reikia sušerti. Vieną tabletę reikia skirti 4 kg kūno svorio arba 5 mg prazikvantelio ir 20 mg bazinio pirantelio 1 kg kūno svorio. Tabletę rekomenduotina duoti tiesiai į burną arba sutrynus įmaišyti į ėdesį. Gydyti rekomenduotina prieš šėrimą.

Dažniausiai pakanka preparatą skirti vieną kartą, tačiau didelės parazitų invazijos atveju rekomenduotina dehelmintizuoti pakartotinai po 14 d. Profilaktiškai kates reikėtų dehelmintizuoti kas 3 mėn.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Negalima naudoti kartu su piperazino junginiais, nes pasireiškia abipusis antagonizmas su piranteliu.

Prieš gydymą alkinti ar laikytis specialaus šėrimo režimo nebūtina.

Katės preparatą labai gerai toleruoja, todėl perdozavimo atvejai būna labai retai. Naudojus 3 kartus didesnę nei rekomenduotina dozę, nepastebėta jokių apsinuodijimo požymių. Jei įtariama, kad preparato buvo perdozuota, reikia imtis atitinkamų gydymo priemonių.

## **10. IŠLAUKA**

Nenumatyta.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Negalima užšaldyti.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Naudojus vaistą reikia plauti rankas.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2008-06-13

## **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.



Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.  
Farmakoterapinė grupė: antihelminčių medžiagų deriniai.  
ATCvet kodas: QP52AA51.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.