

INFORMACINIS LAPELIS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvuota vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Bioveta, a. s.,
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN DHPPi+LR, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai ruošti

Gyva vakcina nuo šunų maro (CDV), infekcinio hepatito (CAV-1), infekcinio laringotracheito (CAV-2), parvovirozės (CPV-2), paragripo (CPIV-2) ir inaktyvuota vakcina nuo šunų leptospirozės ir pasiutligės

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinės dozėje (1 ml) yra:

a) liofilizate (BIOCAN DHPPi) yra:

veikliųjų medžiagų:

gyvų nusilpnintų šunų maro virusų
gyvų nusilpnintų šunų adenovirusų
gyvų nusilpnintų šunų parvovirusų
gyvų nusilpnintų šunų paragripo virusų

ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{3,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{4,5}$ ir ne daugiau kaip $10^{5,5}$ TCID₅₀,
ne mažiau kaip $10^{3,0}$ ir ne daugiau kaip $10^{4,2}$ TCID₅₀,

pagalbinių medžiagų:

liofilizavimo terpės

iki 1 ml,

b) skiediklyje (BIOCAN LR) yra:

veikliųjų medžiagų:

inaktyvuotų pasiutligės virusų
inaktyvuotų *Leptospira icterohaemorrhagiae*
inaktyvuotų *Leptospira canicola*
inaktyvuotų *Leptospira grippotyphosa*

ne mažiau kaip 2 TV,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT*,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,
titras ne mažesnis kaip 32, nustatant MAT,

* vidutinis geometrinis specifinių antikūnų titras, nustatomas mikroaglutinacijos tyrimu;

adjuvanto:

aliuminio hidroksido suspensijos;

pagalbinių medžiagų:

mitybinės terpės.

4. INDIKACIJOS

12 sav. amžiaus ir vyresniems šunims aktyviai imunizuoti nuo šunų maro, infekcinio hepatito, infekcinio laringotracheito, parvovirozės, paragripo, pasiutligės ir dažniausiai pasitaikančių leptospirų padermių (*Leptospira icterohaemorrhagiae*, *Leptospira canicola*, *Leptospira grippotyphosa*).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti karščiuojančių gyvūnų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – žirnio dydžio sukietėjimas, kuris išnyksta per 3 sav. Labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinės gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Nepaisant gyvūno amžiaus, svorio ar veislės, po oda reikia švirkšti 1 ml vakcinos. Pirmą kartą vakcinuoti galima 12 sav. amžiaus šuniukus.

Gyvūno amžius	Pavojus užsikrėsti infekcine liga		
	Nėra	Esant parvovirozės pavojui	Esant maro pavojui
5–6 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8–10 sav.	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12–16 sav.	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Kasmet revakcinuoti	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Pastaba:

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose (P, R, DP, DHPPi) reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų pasirinkimą.

Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN vakcinomis.

Vėliau galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis:

BIOCAN M plus – šunims nuo *Microsporium canis* nuo 8 sav. amžiaus,

BIOCAN B – šunims nuo Laimo ligos nuo 12 sav. amžiaus,

BIOCAN T – šunims nuo stabligės, vyresniems nei 12 sav. amžiaus.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą buteliuką reikia gerai suplakti.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti sausoje vėsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius šunis.

Rekomenduotina likus 10 d. iki numatomos vakcinacijos šunims skirti antiparazitinių vaistų.

Savaitę po vakcinacijos šunys neturi būti treniruojami ar patirti didelių krūvių.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.

Nerekomenduotina vakcinuoti kelių paskutiniąsias dvi šuningumo savaites dėl bendrinių nuostatų (pvz., galimi pažeidimai fiksuojant vaikingą patelę ir pan.).

Vakciną BIOCAN DHPPi+LR galima naudoti atskirai ar kartu su vakcinomis BIOCAN C, BIOCAN M Plus, BIOCAN B.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2009-10-14

15. KITA INFORMACIJA

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvuotos virusinės bei bakterinės šunų vakcinos.

ATCvet kodas: QI07AJ06.

Sušvirkštus vakciną, gyvūnų organizmas vakcinos antigenus priima kaip išorinius veiksnius ir aktyvuoja apsauginius organizmo mechanizmus (makrofagus, opsoninus, interleukinus, B limfocitus ir t.t.), dėl to ima formotis specifiniai vakcinos antigeninių komponentų antikūnai. Vėliau tai saugo organizmą nuo infekcijos patekus užkratui.

Imunitetas pradeda formotis praėjus 14 d. po pirmosios vakcinacijos ir visiškai susiformuoja per kitas 14 d. po revakcinacijos. Revakcinuoti reikia po 14–21 d. Pastoviam vakcinuotų gyvūnų imunitetui palaikyti jie turi būti revakcinuojami kasmet.