

## INFORMACINIS LAPELIS

BIOCAN PUPPY, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina

### 1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Bioveta, a.s.,  
Komenského 212,  
68323 Ivanovice na Hané,  
Čekijos Respublika

### 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN PUPPY, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina

### 3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinės dozėje (1 ml) yra:

vienoje liofilizuotos vakcinės (D) dozėje yra:

**veikliosios medžiagos:**

gyvų šunų maro virusų ne mažiau kaip  $10^{4,2}$  ir ne daugiau kaip  $10^{5,0}$  TCID<sub>50</sub>;

**pagalbinių medžiagų:**

liofilizuojamosios terpės iki 1 ml;

vienoje injekcinės suspensijos (P) dozėje yra:

**veikliųjų medžiagų:**

inaktyvuotų šunų parvovirusų ne mažiau kaip 1 024 ir ne daugiau kaip 4 096 HAU;

**pagalbinių medžiagų:**

aliuminio hidroksido 2 % gelio 10 %.

### 4. INDIKACIJOS

Šunims nuo 5 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti nuo šunų maro ir parvovirozės.

### 5. KONTRAIKACIJOS

Negalima vakcinuoti karščiujančių šunų.

### 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali kilti vietinė reakcija (žirnio dydžio), kuri praeina savaime per 3 sav. Retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vakcinos dozė yra 1 ml, gaunama prieš naudojimą liofilizatą (D) atskiedus skysta vakcina (P). Nepaisant gyvūno amžiaus (bet ne anksčiau kaip 5 sav. amžiaus), svorio ar veislės, po oda rekomenduotina užmentės srityje reikia švirkšti vieną dozę vakcinos. Pirmą kartą vakcinuoti šunys turi būti pakartotinai vakcinuojami po 14–21 d. Norint palaikyti nuolatinį imunitetą, rekomenduotina šunis revakcinuoti kasmet.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vakcinuoti galima tik kliniškai sveikus ir tinkamo įmitimo šunis. Rekomenduotina likus ne mažiau kaip 10 d. iki vakcinacijos šunis dehelminizuoti. Vieną savaitę po vakcinacijos nerekomenduotina vakcinuotus šunis treniruoti ar skirti jiems didelį fizinį krūvį.

Atskiestą vakciną reikia sunaudoti nedelsiant.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

Vakciną galima naudoti vieną arba vienu metu ar derinyje su kitomis Biocan vakcinomis.

### Rekomenduotina vakcinacijos schema

Vakcinacijos schemą turi nustatyti veterinarijos gydytojas, atsižvelgęs į epizootinę situaciją ir su krekenomis igytą pasyvų vakcinuojamų gyvūnų imunitetą. Norint išlaikyti nuolatinį vakcinuotų gyvūnų imunitetą gyvūnus reikia revakcinuoti kasmet.

Rekomenduotina vakcinacijos BIOCAN vakcinomis schema:

Gyvūno amžius	Pavojus užsikrėsti infekcine liga		
	Nėra	Esant parvovirozės pavoju	Esant maro pavoju
5–6 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8–10 sav.	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12–16 sav.	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Kasmet revakcinuoti	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Pastaba:

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose reiškia alternatyvų BIOCAN vakcinų pasirinkimą.

Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis BIOCAN vakcinomis.

Galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis:

BIOCAN M PLUS – šunims nuo *Microsporium canis* nuo 8 sav. amžiaus,

BIOCAN B – šunims nuo Laimo ligos nuo 12 sav. amžiaus,

BIOCAN T – šunims nuo stabligės, vyresniems nei 12 sav. Amžiaus.

Du kartus didesnė nei rekomenduotina vakcinos dozė paskirties gyvūnams nepalankių reakcijų nesukelia.

## 10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti 2–8 °C temperatūroje, sausoje ir tamsioje vietoje. Vakciną negalima užšaldyti.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Nėra.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS**

Išmetamos atliekos turi būti nukenksmintos virinant, sudegintos ar pamerktos į tinkamą dezinfekantą, aprobuotą kompetentingos institucijos.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2008-03-28

## **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarinės gydytojų.

Farmakoterapinė grupė: gyvos ir inaktyvuotos šunų virusinės vakcinės.

ATCvet kodas: QI07AH.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.