

INFORMACINIS LAPELIS
BIOCAN R, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
68323 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIOCAN R, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje vakcinės dozėje (1 ml) yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvuotų pasiutligės virusų, ne mažiau kaip 2 TV,

pagalbinių medžiagų:

MEM terpės, aliuminio hidroksido, tiomersalio.

4. INDIKACIJA

Šunims, katėms, kailiniams žvėreliams, galvijams, arkliams, avims, ožkoms, kiaulėms aktyviai imunizuoti nuo pasiutligės.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima vakcinuoti karščiujančių gyvūnų.

Negalima naudoti nevakcinuotiems gyvūnams, sužeistiems ar turėjusiems kontaktą su sergančiais pasiutlige gyvūnais. Gyvūnus, kurie sukandžiojo arba sužeidė žmogų, galima vakcinuoti tik pasibaigus stebėjimo periodui.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Injekcijos vietoje gali pasireikšti vietinė reakcija – žirnio dydžio sukietėjimas, kuris išnyksta per 3 sav. Labai retai gali pasireikšti padidėjusio jautrumo reakcijos.

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, katės, kailiniai žvėreliai, galvijai, arkliai, avys, ožkos, kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Reikia švirkšti 1 ml vakciną, nepaisant gyvūno amžiaus, svorio ar veislės (bet ne anksčiau kaip 12 sav. amžiaus).

Vakciną reikia švirkšti po oda (geriausiai peties srityje už mentės) arba į raumenis (geriausiai į užpakalinės kojos raumenis).

Gyvūnus galima vakcinuoti nuo 3 mėn. amžiaus. Imunitetas susidaro per 14 dienų po imunizacijos. Gyvūnus, vakcinuotus anksčiau nei 3 mėn. amžiaus, reikia vakcinuoti pakartotinai, kai jiems sukaks 3 mėn. (tarp vakcinacijų turi praėti ne mažiau kaip 14 d.). Gyvūnus, pirmą kartą vakcinuotus 3–12 mėn. amžiuje, pakartotinai vakcinuoti reikia po 1 metų po pirmojo vakcinavimo. Pakartotinai vakcinavus po metų po pirmosios vakcinacijos, vakcina saugo gyvūnus nuo pasiutligės ne trumpiau kaip 2 metus. Norint išlaikyti pastovų imunitetą, rekomenduotina gyvūnus pakartotinai vakcinuoti pagal šalies veterinarinius reikalavimus.

Rekomenduotina vakcinacijos Biocan vakcinomis schema:

Gyvūno amžius	Epidemiologinė situacija		
	Nėra	Esant parvovirozės pavoju	Esant maro pavoju
5–6 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
7–8 sav.		Puppy (P) + C	Puppy (DP, DHPPi) + C
8–10 sav.	DHPPi + L	DHPPi + L	DHPPi + L
12–16 sav.	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)
Kasmet revakcinuoti	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)	DHPPi + LR (R)

Pastaba:

Vakcinų pavadinimai skliausteliuose reiškia galimybę vakcinuoti kita nei Biocan Puppy vakcina.

Vakcinų pavadinimai +C, +L, +LR reiškia galimybę tuo pat metu vakcinuoti kitomis Biocan vakcinomis (pvz., DHPPi, DHP, DP, DH, P, Puppy).

Papildomai galima vakcinuoti ir kitomis vakcinomis: Biocan M – šunims ir katėms nuo *Microsporium canis* nuo 12 sav. amžiaus.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vakcinuoti galima tik sveikus ir gerai įmitusius gyvūnus.

Rekomenduotina likus 10 d. iki numatomos vakcinacijos skirti antiparazitinių vaistų.

Savaitę po vakcinacijos nerekomenduotina gyvūnų treniruoti ar kitaip jiems kelti įtampą.

Nerekomenduotina naudoti vaikingoms patelėms paskutiniąsias dvi vaikingumo savaites.

Vakciną Biocan R galima naudoti atskirai, vienu metu ar kartu su kitomis Biocan vakcinomis:

a) vakcina Biocan R galima tirpinti liofilizuotas Biocan vakcinas (pvz., Biocan DHPPi, DP, P),

b) vakciną Biocan R galima naudoti kartu su skystomis vakcinomis Biocan C, Biocan B, Biocan M ir Biocan L.

Vakcinavus dvigubai didesne doze paskirties gyvūnams šalutinio poveikio nenustatyta.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti sausoje, tamsioje vietoje 2–8 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Prieš naudojimą vakciną reikia suplakti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-06-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Farmakoterapinė grupė: inaktyvuota virusinė vakcina. ATCvet kodas: Q15AA.

Sušvirkštus vakciną, gyvūnų organizme vakcinos antigenai, kaip išoriniai veiksniai, aktyvina daugelį apsauginių organizmo mechanizmų (makrofagus, opsoninus, interleukinus, B limfocitus ir t. t.), todėl susidaro specifiniai vakcinos antigeninių komponentų antikūnai. Tai neleidžia plisti patekusiems ligos sukėlėjams.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.