

INFORMACINIS LAPELIS

ERYSIN SINGLE SHOT, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bioveta Plc.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
Čekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ERYSIN SINGLE SHOT, inaktyvuota vakcina, injekcinė suspensija

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

2 ml vakcinės suspensijos yra:

veikliosios medžiagos:

inaktyvuotų *Erysipelothrix rhusiopathiae*

(trys 2 tipo padermės ir viena 1 tipo padermė)

RP ne mažiau kaip 1*;

adjuvanto:

aliejinės emulsijos;

pagalbinių medžiagų:

formaldehido 35 % tirpalo, tiomersalio.

* – santykinis stiprumas (RP) nustatomas palyginus su referencine vakcina, atitinkančia paskirties gyvūnų užkrėtimo tyrimą pagal atnaujintos Ph. Eur. monografijos reikalavimus.

4. INDIKACIJA

Kiaulėms imunizuoti nuo raudonligės.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Reikia vengti vakcinuoti kiaules, kurioms pasireiškė raudonligės požymiai, paršavedes likus 2 sav. iki atsivedimo ir 4 sav. po paršiavimosi bei paršelius iki 8 sav. amžiaus.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Po vakcinavimo (po 2–4 val.) gali laikinai pakilti kūno temperatūra, sumažėti apetitas, atsirasti mieguistumas. Šie simptomai praeina per 24–36 val. Gali pasireikšti injekcijos vietos reakcija (tynis), kuri praeina per 2–3 sav.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinės gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarinės preparatų inspekciją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Kiaulės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vieną vakciną dozę (2 ml) reikia švirkšti po oda.
Kiaules pirmą kartą vakcinuoti reikia nuo 8 sav. amžiaus.
Veisiamas kiaules reikia revakcinuoti kas 6 mėn.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakti.
Injekcijos vietoje pavieniais atvejais raumenyse gali susidaryti maži fibrininiai mazgeliai. Šiuos mazgelius reikia pašalinti dorojant skerdieną.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti sausoje tamsioje vietoje, 2–8 °C temperatūroje. Negalima užšaldyti.
Tinkamumo laikas pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę – 10 val.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Naudotojui

Preparate yra mineralinio aliejaus. Atsitiktinai išvirkštus/įsišvirkštus gali atsirasti stiprus skausmas ir tynis, ypač sušvirkštus į sąnarį ar pirštą, retai dėl to galima netekti piršto, jei laiku nesuteikiama skubi medicininė pagalba.

Atsitiktinai išvirkštus šio vaisto, būtina nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos, nepaisant sušvirkšto labai nedidelio preparato kiekio, ir su savimi turėti šio vaisto informacinį lapelį.

Jei suteikus medicininę pagalbą skausmas trunka daugiau kaip 12 val., reikia kreiptis pakartotinai.

Gydytojui

Preparate yra mineralinio aliejaus. Sušvirkštas net mažas vaisto kiekis gali sukelti didelį tynį, kuris gali, pvz., sukelti išeminę nekrozę ar net galima netekti piršto. Būtina SKUBI kvalifikuota chirurginė pagalba, gali tekti įpjauti ir praplauti injekcijos vietą, ypač jei apimti piršto minkštimas ar sausgyslė.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2007-06-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama tik veterinarinės gydytojų.

Farmakoterapinė grupė: inaktyvuota kiaulių vakcina nuo raudonligės. ATCvet kodas: QI09AB03.
Patekę į kiaulių organizmą, vakcinos antigenai stimuliuoja specifinių antikūnų sintezę, todėl susiformuoja aktyvus imunitetas kiaulių raudonligei. Sušvirškštus vakciną, imunitetas visiškai susiformuoja praėjus 21 d.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.