

INFORMACINIS LAPELIS
FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM ĖEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:

Bioveta, a.s.,
Ivanovice na Hané,
ekijos Respublika

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

FERRIBION 10 %, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

geležies (dekstrano) 100 mg.

4. INDIKACIJOS

Suaugusiems galvijams, arkliams, avims, ožkoms, veršeliams, paršeliams, riukams, šunims, audin ms ir lap ms gydyti, sergant pirmine mažakraujyste, ypa hipochromine mažakraujyste, kuriai b dinga depresija, blyški gleivin , subnormali temperat ra ir neinfekcinis viduriavimas ar antrine mažakraujyste d l ilgo kraujavimo po traum , chirurgini intervencij , komplikuoto atsivedimo, parazitini lig , kaip pagalbin priemon sergantiems infekcin mis ligomis, išsekusiems ir profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

N ra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pasteb jus bet kok sunk poveik ar kit šiame informaciniame lapelyje nepamin t poveik , b tina informuoti veterinarijos gydytoj ar Lietuvos valstybin veterinarijos preparat inspekcij .

7. PASKIRTIES GYV N R ŠYS

Suaug galvijai, arkliai, avys, ožkos, veršeliai, paršeliai, riukai, šunys, audin s ir lap s.

8. DOZ S, NAUDOJIMO B DAS IR METODAS KIEKVIENAI R ŠIAI

Vaist reikia švirkti kaklo ar vidin s pus s šlaunies raumenis (paršeliams) naudojant plon adat tokiomis doz mis:

	profilaktiškai	gydyti
suaugusiam galvijui, arkliui	4–8 ml	8–12 ml
veršeliui, aviai, ožkai	2–4 ml	4–6 ml
2-3 d. amžiaus paršeliui	1–2 ml	2–2,5 ml
riukui	1,5–2,5 ml	2–4 ml
šuniui	1–2 ml	Profilaktines dozes reikia švirkšti 2–3 kartus kas 1–2 sav.
8-12 sav. amžiaus audinei	0,5 ml	
3 m n. ir vyresnei audinei	1 ml	
6-12 sav. amžiaus lapei	1 ml	
3 m n. ir vyresnei lapei	2 ml	

Nerekomenduotina vien viet švirkšti daugiau kaip 5 ml tirpalo.

9. NUORODOS D L TINKAMO NAUDOJIMO

Galima naudoti vaikingoms patel ms ir laktacijos metu.

Vaistas gerai toleruojamas paršeli . Naudojus dvigub doz , joki nepalanki reakcij nepasireišk .

10. IŠLAUKA

0 par .

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaik .

Laikyti ne aukštesn je kaip 25 °C temperat roje, tamsioje vietoje.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas atkimšus – 28 d.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

N ra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudoto veterinarinio vaisto liku iai ar su juo susijusios atliekos turi b ti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2008-06-13

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė : antianeminiai vaistai, geležies dekstranas.
ATCvet kodas: QB03AC90.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.