

## INFORMACINIS LAPELIS

Injectio Glucosi 40 % Biowet

400 mg/ml infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms

### 1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Biowet - Puławy Sp. z o.o.,

ul. Arciucha 2,

24-100 Puławy,

Lenkija

Tel. / faks.: +48 81 886 33 53

Tel. +48 81 888 91 00

El. paštas: [biowet@biowet.pl](mailto:biowet@biowet.pl)

### 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Injectio Glucosi 40 % Biowet

400 mg/ml infuzinis tirpalas arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms

### 3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

**veikliosios medžiagos:**

gliukozės (gliukozės monohidrato) 400,0 mg;

**pagalbinių medžiagų** iki 1 ml.

### 4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, galvijams, avims, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, esant energijos trūkumui, hipoglikemijai, ketozei. Vaistas skatina diurezę, taip pat naudotinas kaip pagalbiniė priemonė sergantiems kepenų ligomis gyvūnams gydyti.

### 5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, esant hiperglikemijai, hiperhidracijai, acidozei ir hipotoninei dehidracijai.

### 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, avys, ožkos, kiaulės, šunys, katės.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Pašildytą iki kūno temperatūros vaistą lėtai švirkšti į veną tokiomis dozėmis:

Gyvūno rūšis	Gliukozės kiekis	Vaisto kiekis
Galvijai, arkliai	100,00–125,00 g	250,0–312,5 ml
Avys, ožkos, kiaulės	12,50–25,00 g	31,0–62,5 ml
Šunys, katės	1,25–7,50 g	3,0–19,0 ml

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš švirkščiant į veną, vaistą pašildyti iki kūno temperatūros ir švirkšti lėtai

## 10. IŠLAUKA

Šunims  
Nenumatyta.

Galvijams, arkliams, kiaulėms, avims, ožkoms  
0 parų.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.  
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos. Negalima sušaldyti.  
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės.  
Atidarius buteliuką, būtina sunaudoti nedelsiant.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.  
Perdozavimas gali sukelti laikiną hiperglikemiją ir osmosinę diurezę. Gliukozės perteklius, t.y. koncentracijai kraujyje viršijus inkstų slenkstį, šalinamas per inkstus pasireišiant gliukozurijai.  
Nustatytas cheminis gliukozės tirpalų nesuderinamumas su barbitūratais, sulfonamidais, eritromicinu, hidrokortizonu ir vitaminu B<sub>12</sub>.

## 13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.  
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

## 14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-09-16

## **15. KITA INFORMACIJA**

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.