

**INFORMACINIS LAPELIS**  
LOTAGEN, makšties tirpalas

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas:

Bioveta Plc.,  
Komenského 212,  
68323 Ivanovice na Hané,  
Čekijos Respublika

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

LOTAGEN, makšties tirpalas

**3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS**

Viename buteliuke (150 ml) yra:

**veikliosios medžiagos:**

polikrezuleno (m-krezolsulfo rūgšties polikondensato ir formaldehido (santykiu 14:1)) 2,16 g;

**pagalbinės medžiagos:**

išgryninto vandens iki 150 ml.

**4. INDIKACIJOS**

Karvėms ir paršavedėms, esant lytinių takų patologijai ar pažeidimams (nevaisingumui, sukeltam ūmių infekcinių ligų, gimdos kaklelio, makšties, išorinių lytinių organų uždegimui, trichomonozei, urovaginitui, esant makšties pažeidimams ar kraujavimui), kai reikalingas antimikrobinis, selektyvus koaguliuojamasis ir adstringuojantis poveikis.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Nežinomos. Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją ar Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją.

**7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Galvijai ir kiaulės.

**8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Karvei, sergančiai vaginitu, vulvitu, gimdos kaklelio uždegimu, į lytinius takus reikia dėti preparatu sumirkytą tamponą (kurį vėliau būtina išimti) arba makštį praplauti preparatu.

MMA sindromu sergančiai paršavedei, per 12 val. po paršiavimosi, makštį reikia praplauti ne mažiau kaip 300 ml preparato.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Būtina vengti, kad preparato nepatektų į akis.  
Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

## 10. IŠLAUKA

0 parų.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.  
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.  
Negalima sušaldyti.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistui patekus ant medžiagos ar odinių gaminių būtina nedelsiant plauti vandeniu. Būtina vengti, kad preparato nepatektų į akis.

## 13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.  
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.  
Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## 14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2006-08-30

## 15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.  
Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: antiseptinės medžiagos. ATCvet kodas: QG51B.

**Farmakodinaminės savybės.** Lotagen, makšties tirpalas pasižymi keletu veikimo mechanizmų. Antimikrobinis poveikis nustatytas tyrimais *in vitro*. Esant koncentracijai 0,15–0,2 mg/ml, vaistas veikia daugelį bakterijų ir mikroskopinius grybus. Priešingai nei kitos chemoterapinės medžiagos (antibiotikai), kurie stabdo mikroorganizmų fermentų veikimą, preparatas tiesiogiai veikia bakterijų, mikroskopinių grybų, mielių ir pirmuonių sienelę, todėl gali būti naudojamas kaip antiseptikas. Nėra duomenų, kad vystytųsi mikroorganizmų atsparumas polikrezuleniui.  
Selektyvus koaguliuojamasis poveikis: Preparatas atiboja sveikus audinius nuo patologiškai pakitusių, koaguliuoja negyvybingas ląsteles, kurios nuolat pašalinamos iš organizmo (demarkacija, eliminacija). Be to vaistas skatina nepažeistų ląstelių dalijimąsi ir greitina pažeistos gleivinės regeneraciją bei odos epitelizaciją.

Adstringuojantis poveikis: vaistas skatina lygiųjų raumenų susitraukimus ir siaurina smulkių kraujagyslių spindį, mažina kraujavimą.

**Farmakokinetinės savybės.** Naudojus vietiškai veiklioji medžiaga beveik nesirezorbuoja. Švirkštus į veną vaistas greitai pašalinamas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.