

**INFORMACINIS LAPELIS**  
BIMECTIN 18,7 mg/g, geriamoji pasta arkliams

**1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Tiekimo rinkai teisės turėtojas:

Bimeda Chemicals Export,  
Broomhill Road, Tallaght,  
Dublin 24,  
Airija

Vaisto serijos gamintojas:

Cross Vetpharm Group Limited,  
Broomhill Road, Tallaght,  
Dublin 24,  
Airija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

BIMECTIN 18,7 mg/g, geriamoji pasta arkliams

**3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 g pastos yra:

**veikliosios medžiagos:**

ivermektino

18,7 mg;

**pagalbinių medžiagų** (polisorbato 80, kukurūzų aliejaus, koloidinio silicio dioksido, obuolių skonio medžiagos)

iki 1 g.

**4. INDIKACIJOS**

Arkliams dehelmintizuoti, užsikrėtus:

**didžiaisiais strongilais** (*Strongylus vulgaris* (subrendusiais ir ketvirtos stadijos (arterijų) lervomis), *S. edentatus* (subrendusiais ir ketvirtos stadijos (audinių) lervomis), *S. equinus* (subrendusiais), *Triodontophorus brevicauda* (subrendusiais), *T. serratus* (subrendusiais), *T. tenuicollis* (subrendusiais), *Craterostomum acuticaudatum* (subrendusiais)), **mažiaisiais strongilais** (subrendusiais ir ketvirtos stadijos lervomis, tarp jų benzimidazoliui jautriomis padermėmis: *Coronocyclus coronatus*, *C. labiatus*, *C. labratus*, *Cyatostomum catinatum*, *C. pateratum*, *Cylicocyclus ashworthi*, *C. elongatus*, *C. insigne*, *C. leptostomum*, *C. nassatus*, *C. radiatus*, *Cylicostephanus asymmetricus*, *C. bidentatus*, *C. calicatus*, *C. goldi*, *C. longibursatus*, *C. minutus*, *Cylicodontophorus bicornatus*, *Gyalocephalus capitatus*, *Parapoteriostomum euproctus*, *P. mettami*, *Petrovinema poculatum*, *Poteriostomum imparidentatum*, *P. ratzii*), **kitomis apvaliosiomis kirmėlėmis** (*Dictiocaulus arnfeldi* (subrendusiais ir nesubrendusiais), *Oxyuris equi* (subrendusiais ir nesubrendusiais), *Parascaris equorum* (subrendusiais ir trečios bei ketvirtos stadijos lervomis), *Trichostrongylus axei* (subrendusiais), *Habronema muscae* (subrendusiais), *Onchocerca* spp. (mikrofiliarijomis), *Strongiloides westeri* (subrendusiais)), **burnos ir skrandžio gyliais** (*Gasterophilus* spp.) (lervomis).

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

## 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Pastą reikia duoti *per os* vieną kartą po 0,2 mg ivermektino 1 kg kūno svorio. Viename švirkšte yra 120 mg ivermektino, kurio pakanka 600 kg svorio arkliui.

### Naudojimo nurodymai

Kiekviena švirkšto stūmoklio svorio žyma atitinka pastos kiekį, reikalingą 100 kg arklio kūno svorio. Nustatant dozę, reikia atpalaiduoti stūmoklio fiksatorių (žiedą), pasukant  $\frac{1}{4}$  apskos ir nustumti stūmokliu tiek, kad arčiau prie švirkšto cilindro esanti pusė atsidurtų ties reikiama svorio žyma, po to sukelti stūmoklio fiksatorių  $\frac{1}{4}$  apskos, kad užsifikuotų. Prieš duodant pastą, būtina įsitikinti, ar arklio burnoje nėra pašaro likučių. Nuo švirkšto antgalio nuėmus plastikinį gaubtelį reikia švirkštą įkišti į arklio burną per bedantį kraštą ir stumiant stūmoklį iki fiksuotos atžymos suleisti pastą ant liežuvio pagrindo. Sudavus preparatą, arklio galvą reikia nedelsiant kelioms sekundėms pakelti aukšty.

### Parazitų kontrolės programa

Į reguliarios parazitų kontrolės programą turi būti įtraukti visi arkliai, ypatingą dėmesį skiriant kumelėms, kumeliukams ir šiūmečiams kumeliukams. Kumeliukus reikia pradėti gydyti nuo 6–8 sav. amžiaus ir gydyti pakartotinai, kai tai yra būtina. Vaistas efektyviai veikia virškinimo trakto, odos ir plaučių nematodus bei burnos ir skrandžio gylius.

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Kaip ir naudojant kitus antihelmintikus, būtina pasitarti su veterinarijos gydytoju dėl tinkamo dozavimo ir bandos vadybos, norint užtikrinti tinkamą parazitų kontrolę ir nepadidinti atsparumo antihelmintikams.

Galima naudoti kumelėms bet kuriuo vaikingumo ar laktacijos metu. Vaistas neturi poveikio veisiamų kumelių ir eržių vaisingumui ir jį galima naudoti įvairaus amžiaus arkliams, tarp jų, kumeliukams. Skyrus 1,8 mg/kg dozę (9 kartus didesnę nei rekomenduotina) pastebėti nežymūs laikini požymiai (lėtesnė vyzdžių reakcija į šviesą ir depresija). Skyrus didesnę dozę, pastebėti ir kiti požymiai – midriazė, ataksija, drebulys, sąstingis, koma ir mirtis. Ne tokie sunkūs požymiai buvo laikini. Priešnuodžiai nežinomi, tačiau simptominis gydymas gali būti naudingas.

## 10. IŠLAUKA

Arkliai ir subproduktams – 34 paros.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Naudojant vaistą negalima rūkyti ar valgyti.

Naudojus vaistą reikia plauti rankas.

Negalima leisti šunims ir katėms praryti išsiliejusios pastos ir prieiti prie naudotų švirškštų.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2009-03-09

## **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: endektocidinės medžiagos.

ATCvet kodas: QP54AA01.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo vietiniu atstovu.

OŪ Zoovetvaru,

Uusaru 5,

Saue 76505,

Estija

Tel. +372 6709 006