

**INFORMACINIS LAPELIS**  
DEPOGESTON BIOWET, 50 mg/ml injekcinė suspensija šunims ir katėms

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Biowet - Puławy Sp. z o.o.,  
ul. Arciucha 2,  
24-100 Puławy,  
Lenkija  
Tel. / faks.: +48 81 886 33 53  
Tel. +48 81 888 91 00  
El. paštas: [biowet@biowet.pl](mailto:biowet@biowet.pl)

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

DEPOGESTON BIOWET, 50 mg/ml injekcinė suspensija šunims ir katėms

**3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 ml suspensijos yra:

**veikliosios medžiagos:**

medroksiprogesterono acetato                      50 mg;

**pagalbinių medžiagų**                                      iki 1 ml.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Kalėms ir katėms rujai slopinti.  
Katėms gydyti esant metroragijai ir nimfomanijai.  
Kalėms tariamo vaikingumo profilaktikai.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Negalima naudoti:

- prooestrus, oestrus ir metoestrus lytinio ciklo fazių metu,
- šuningoms kalėms,
- esant diagnozuotų pieno liaukos navikų,
- nesubrendusiems ir augantiems gyvūnams,
- cukriniu diabetu sergantiems gyvūnams,
- esant reprodukcinės sistemos uždegiminiams procesams,
- anglų kurtų veislės kalėms.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Naudojant vaistą gali pasikeisti gyvūno temperamentas, padidėti apetitas, pasireikšti laktacija.  
Naudojant vaistą gali išvešėti gimdos gleivinė.  
Retais atvejais injekcijos vietoje gali pakisti odos ir kailio spalva.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepamintą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## **7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Šunys, katės.

## **8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Švirkšti po oda arba į raumenis.

Pirmą kartą vaistą naudoti ne anksčiau nei 2 mėn. po jauniklių atsivedimo ir ne vėliau nei 1 mėn. iki numatomos rujos. Toliau kalėms vaistą naudoti kas 5 mėn., katėms – kas 3–4 mėn.

Rekomenduojama dozė kalėms – 50–100 mg medroksiprogesterono acetato gyvūnui, švirkščiant po oda arba į raumenis:

- mažiems gyvūnams (iki 10 kg kūno svorio) – 1,0 ml vaisto gyvūnui;
- vidutinio dydžio (10–25 kg kūno svorio) ir dideliems (25–45 kg kūno svorio) – 1,5–2,0 ml vaisto gyvūnui.

Rekomenduojama dozė katėms – 50 mg medroksiprogesterono acetato gyvūnui, t.y. 1,0 ml vaisto gyvūnui, švirkščiant po oda.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Prieš naudojant suplakti.

## **10. IŠLAUKA**

Nenumatyta.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Negalima užšaldyti.

Tinkamumo laikas, pradūrus buteliuko kamštelį, – 14 d.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Gydymą reikia pradėti ne anksčiau nei 2 mėn. po jauniklių atsivedimo ir ne vėliau nei 1 mėn. iki numatomos rujos.

Ilgai naudojant, vaistas gali sukelti gimdos ir pieno liaukos ligas, slopinti antinksčių veiklą, sukelti diabetą.

Atsitiktinai įsišvirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima naudoti vaikingoms patelėms. Naudojant laktacijos metu slopinama pieno liaukos funkcija dėl hipofizės gonadotropinų sekrecijos slopinimo.

Ilgalaikis vaisto naudojimas kalėms gali sukelti pūlingą gimdos uždegimą ir gimdos gleivinės išvešėjimą. Perdozavus kuriam laikui gali pakisti gyvūno elgsena, padidėti apetitas, pasireikšti laktacija.

Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

**13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ  
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2010-07-23

**15. KITA INFORMACIJA**

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.